

# 感染動物実験における安全対策

国立大学動物実験施設協議会  
1987年5月 制定  
2000年6月 2日 改訂  
2001年5月25日 改訂

医学生物学研究における実験動物への病原体の感染実験を対象とする。これと同様の危険性が考えられるものとして、病原性の高い病原体に自然感染し病原体を排泄する可能性が考えられる実験動物、特に野生動物を取り扱う場合も対象とする。

安全度は1・4に分ける。これは人に対する危険性から分類されたものであって、試験管内実験におけるクラス1・4にほぼ相当する。実験動物間での伝播に特に注意を要する環境での実験、すなわち、病原体による同居感染の可能性があるため、他の正常動物との隔離を特に必要とする場合には1ランク上げるものとする。(分類表中アスタリスク[\*]で示す)。

安全度1：人に対して病原性をほとんど示さず、人の実験室感染及び実験動物間での同居感染の可能性がほとんどないもの。

安全度2：以下の条件の何れかに該当するもの。

1. 通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を防ぐことが可能であるもの。
2. 実験動物に感染し、病原性を示したり、動物実験成績への影響の可能性のあるもの。

安全度3：以下の条件の何れかに該当するもの。

1. 通常の病原微生物学的設備および操作手順で人への実験室感染を確実に防ぐことが出来るが、感染発病した場合には重症になる可能性のあるもの。
2. 人への実験室感染の可能性が高く、感染発病した場合、重症になる可能性があるもので、有効な予防法または治療法の存在するもの。
3. 実験動物に感染する病原体で、感染性や病原性が強く、感染した場合には動物実験への影響が大きいもの。

安全度4：人への実験室感染の可能性が高く、感染した場合、重症になる可能性のあるもので有効な予防法又は治療法が存在しないもの。

## 標準操作手順及び設備基準

### [安全度1]

#### 標準操作手順

1. 感染実験区域内への飲食物の持込みまたは喫煙を禁止する。
2. 動物飼育室内に手洗い装置を設け、作業後は手指の洗浄消毒を行う。
3. 作業時には、マスク、帽子及びゴムまたはプラスチック製手袋を着用する。
4. 床敷交換などの作業時のエアロゾル発生を極力防ぐ。
5. 使用済みケージ等汚染器材は消毒または滅菌したのち洗浄する。
6. 汚染床敷や動物由来排泄物は消毒または滅菌したのち廃棄する。
7. 動物死体は焼却する。
8. 動物飼育室内では専用の作業衣、長靴などを着用する。
9. 動物実験関係者以外の立ち入りを制限する。

#### 安全設備

1. 動物の飼育は脱出防止装置の付いたケージ内でおこなう。

#### 動物飼育室の構造

1. 感染実験区は他の区域と区別し、昆虫及びげっ歯類の侵入を防止する。
2. 床、壁には耐水性でかつ消毒薬耐性の素材を用いる。
3. その他は非感染動物飼育室の構造に準じる。

### [安全度2]

#### 標準操作手順

安全度1の手順に以下を加える。

1. 使用済みのケージなど汚染器材や動物死体は高圧蒸気滅菌を行ったのち洗浄または焼却する。

#### 安全設備

##### 単純飼育時

1. マウス、ラットの飼育にはケージにフィルターキャップをかぶせたり、あるいは感染動物用アイソレータ（A形、B形）内で行う。

##### 飼育管理作業時及び接種・解剖作業時

1. 高濃度のエアロゾルを発生する作業は、クラスⅠ、Ⅱ形生物学用安全キャビネットおよび感染動物用安全キャビネット、または感染動物用アイソレータ（A形、B形）内でおこなう。

##### その他

1. 感染実験区域内に高圧蒸気滅菌装置を設置する。

#### 動物飼育室の構造

1. 安全度Ⅰに準じる。

### [ 安全度Ⅲ ]

#### 標準操作手順

安全度Ⅱの操作手順に以下を加える。

1. 動物飼育は原則として実験担当者が行う。

#### 安全設備

##### 単純飼育時

1. 動物の飼育は感染動物用安全キャビネットまたは感染動物用アイソレータ（A形）内でおこなう。

##### 飼育管理作業時及び接種・解剖作業時

1. クラスⅠ、Ⅱ形生物学用キャビネットおよび感染動物用安全キャビネット、または感染動物用アイソレータ（A形）内でおこなう。

##### その他

1. 安全度Ⅱに準じる。

#### 動物飼育室の構造

1. 動物飼育室の窓は非開閉式にする。
2. 動物飼育室内は陰圧に保ち、準備室、飼育前室から動物飼育室内へ空気が流入する一定方向気流方式の空調を行う。
3. 非常用電源の確保や逆流防止ダンパーの設置により、停電時の空気の逆流防止対策を考慮する。
4. 動物飼育室からの排気は高性能フィルタで濾過したのち放出する。
5. 感染実験区域の入口にはエアロックまたは二重ドアを設置する。
6. 配管貫通部を塞ぎ、動物飼育室内のホルマリンガスによる燻蒸消毒が可能な密閉構造とする。

### [ 安全度Ⅳ ]

#### 標準操作手順

安全度Ⅲの操作手順に以下を加える。

1. 隔離区域から出る際にはシャワーを浴びる。

#### 安全設備

##### 単純飼育時、飼育管理作業時、及び接種・解剖作業時

1. 動物飼育実験はすべて完全密閉のグローブボックス型安全キャビネット内で行う。この安全キャビネットには両面高圧蒸気滅菌装置、消毒薬槽（ダункタンク）及び二重扉の器材搬出入口を設ける。
2. 使用済みケージ、器材、実験試料、動物死体はすべてグローブボックス型安全キャビネットに取り付けた両面高圧蒸気滅菌装置で滅菌したのち取り出す。動物死体はさらに焼却する。
3. 病原体試料は完全密閉の小型容器にいれ、消毒薬槽を通して表面を消毒したのち取り出す。
4. 動物や試料の搬入は器材搬出入口を通して行う。この際、二重扉間の空気は過酢酸等で滅菌する。
5. 実験室とサポット域の間に実験器材の搬出入用として両扉高圧蒸気滅菌装置及び両扉ガス（エチレンオキサイドまたはホルマリン）滅菌装置を設ける。

#### 動物飼育室の構造

1. 独立した建物として、隔離域とそれを取り囲むサポット域を設ける。
2. 壁、床、天井はすべて耐水性かつ気密性のものとし、これらを貫通する部分（給排気管、電気配線、ガス、水道管等）も気密構造とする。
3. 作業者の出入口には、エアロックとシャワーをもうける。
4. 実験室内の気圧には隔離の程度に応じて差を設け、高度の隔離域から低度の隔離域へ、また低度の隔離域からサポット域へ空気が流出しないようにする。

5. 実験室への給気は、1層のHEPAフィルタを通す。実験室からの排気は2層のHEPAフィルタを通して外部に出す。  
この排気滅菌装置は予備を含めて2組設け、さらにその場において滅菌可能な構造とする。
6. 実験室からの研究排水は 120℃ 加熱滅菌し、冷却したのち、一般下水へ放出する。

#### 動物実験における病原体の安全度分類

注) 本分類は参考資料としてまとめたものであり、その運用に当たっては各大学のバイオセーフティ委員会や動物実験施設関係者等の協議により、判断するものとする。(アンダーライン: 主に実験動物に感染する病原体 \* : 正常動物との隔離を特に必要とする場合には1ランク上げる)

#### ウイルス

##### Class 1

Live vaccine virus (Vaccinia, Rabies, Rinderpest vaccine を除く)

##### Class 2

BK

Batai

Borna

Bunyamwera

California encephalitis

Canine adeno (Infectious canine hepatitis)

Canine distemper

Canine parvo

Canine herpes 1 (Guinea pig cytomegalo)

Cowpox

Coxsackie (全型)

Dengue (全型)

Echo (全型)

Ectromelia (Mouse pox) \*

Encephalomyocarditis (EMC)

Entero (68, 69, 70, 71)

Epstein-Barr (EB)

Feline calici

Feline immunodeficiency

Feline infectious peritonitis

Feline leukemia

Feline panleukopenia

Feline rhinotrachitis

Gibbon ape lymphosarcoma

Hepatitis (A, B, C, D, E)

Herpes papio

Herpes saimiri

Herpes simplex (1, 2)

Human Parvo

Human Rhino

Human Rota

Human T-cell leukemia -lymphoma (HTLV 1, 2)

Human adeno

Human astro

Human calici

Human corona

Human cytomegalo

Human herpes (6, 7, 8)

Human papilloma

Influenza (A, B, C)

JC

Japanese encephalitis

Kilham ' s rat  
La Crosse  
Lactate dehydrogenase-elevating (LDV)  
Langat  
Measles (SSPE を含む)  
Minute virus of mice (MVM)  
Monkey pox \*  
Mouse adeno  
Mouse cytomegalo  
Mouse encephalomyelitis (TMEV)  
Mouse hepatitis \*  
Mouse polyoma  
Mouse rota(EDIM)  
Mouse thymic  
Mumps  
Murine leukemia  
Myxoma \*  
Newcastle disease  
Orbi  
O ' Nnyong-Nnyong  
Parainfluenza ( 1-Sendai\*, 2, 3, 4 )  
Pneumonia virus of mice(PVM)  
Polio (1, 2, 3)  
Prion disease agents (Creutzfeldt-Jakob, BSE, Scrapie)  
Rabbit hemorrhagic disease \*  
Rabbit parvo  
Rabbit pox  
Rabbit rota  
Rat cytomegalo  
Rabies (fixed, live vaccine)  
Reo  
Respiratory syncytial (RS)  
Rinderpest (vaccine strain)  
Rio Bravo  
Rubella  
Sendai (HVJ)\*  
Sialodacryoadenitis ( rat corona )  
Simian immunodeficiency (SIV)  
Sindbis  
Vaccinia  
Varicella -Zoster  
Vesicular stomatitis  
Woodchuck hepatitis  
Wooly monkey lymphosarcoma  
Yaba monkey tumor pox

### Class 3

Chikungunya  
Colorado tick fever  
Eastern equine encephalomyelitis  
Hanta (Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) )  
Herpes ateles  
Human immunodeficiency (HIV 1,2)  
Kysanur forest disease  
Lymphocytic choriomeningitis (LCM)

Mayaro  
Murray valley encephalitis  
Negishi  
Powassan  
Rabies (street strain)  
Rift valley fever  
Russian Spring-Summer encephalitis  
Semliki forest  
St. Louis encephalitis  
Tacaribe  
Tanapox  
Tick-borne encephalitis  
Venezuelan equine encephalitis (VEE)  
Western equine encephalitis (WEE)  
West Nile fever

Class 4

Crimean Congo hemorrhagic fever  
Ebola  
Hanta (Hantavirus pulmonary syndrome (HPS))  
Herpes B \*\*  
Junin  
Lassa fever  
Machupo  
Marburg disease  
Variola (major, minor)  
Yellow fever (17D vaccine strain を除く)

\*\* : B ウイルスの診断のため、少量の培養を含む検査は安全度 3 の設備で実施できるとの見解が、国立感染症研究所の病原体等安全管理規程に示されている。

細菌およびマイコプラズマ

(ここにない細菌およびマイコプラズマの分類は、日本細菌学会バイオセフティ指針を参考にする)

Class 1

Class 2 および Class 3 に属さない細菌  
(Class 2 あるいは Class 3 に近縁種がある場合は、それを参考に判断する)

Class 2

*Actinomadura madurae*  
*Actinomadura pelletieri*  
*Actinomyces bovis*  
*Actinomyces israelii*  
*Actinomyces pyogenes*  
*Actinomyces viscosus*  
*Aeromonas hydrophila*(毒素原性株)  
*Aeromonas sobria*(毒素原性株)  
*Bacillus cereus*(毒素原性株)  
*Bordetella bronchiseptica*  
*Bordetella parapertussis*  
*Bordetella pertussis*  
*Borrelia* (全菌種)  
*Burkholderia cepacia*  
*Calymmatobacterium granulomatis*  
*Campylobacter coli*  
*Campylobacter jejuni*

*Chlamydia pneumoniae*  
*Chlamydia trachomatis*  
Cilia-associated respiratory(CAR) bacillus  
*Clostridium botulinum*  
*Clostridium difficile*  
*Clostridium haemolyticum*  
*Clostridium histolyticum*  
*Clostridium novyi*  
*Clostridium perfringens*(毒素原性)  
*Clostridium piliforme* (Tyzzer's organism) \*  
*Clostridium septicum*  
*Clostridium sordelli*  
*Clostridium sporogenes*  
*Clostridium tetani*  
*Corynebacterium diphtheriae*  
*Corynebacterium jeikeium*  
*Corynebacterium kutscheri* \*  
*Corynebacterium pseudodiphtheriticum*  
*Citrobacter freundii*  
*Citrobacter rodentium*(*Escherichia coli* O115a,c;K(B))  
*Erysipelothrix rhusiopathiae*  
*Escherichia coli* (*E.coli*,K12 株,B 株並びにその誘導体を除く)  
*Francisella novicida*  
*Fusobacterium necrophorum*  
*Haemophilus*(*Actinobacillus*) *actinomyces**comitans*  
*Haemophilus ducreyi*  
*Haemophilus influenzae*  
*Helicobacter hepaticus*  
*Helicobacter pylori*  
*Klebsiella oxytoca*  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Legionella* 全菌種(*Legionella*-like organisms を含む)  
*Leptospira interrogans* 全血清型  
*Listeria monocytogenes*  
*Moraxella* (*Branhamella*) *catarrhalis*  
*Mycobacterium avium*  
*Mycobacterium chelonae*  
*Mycobacterium fortuitum*  
*Mycobacterium haemophilum*  
*Mycobacterium intracellulare*  
*Mycobacterium kansasii*  
*Mycobacterium leprae*  
*Mycobacterium ulcerans*  
*Mycobacterium lepraemurium*  
*Mycobacterium malmoense*  
*Mycobacterium marinum*  
*Mycobacterium paratuberculosis*  
*Mycobacterium scrofulaceum*  
*Mycobacterium simiae*  
*Mycobacterium szulgai*  
*Mycobacterium xenopi*  
*Mycoplasma arthritidis*  
*Mycoplasma hominis*  
*Mycoplasma neurolyticum*  
*Mycoplasma pneumoniae*

Mycoplasma pulmonis \*  
*Neisseria gonorrhoeae*  
*Neisseria meningitidis*  
*Nocardia asteroides*  
*Nocardia brasiliensis*  
*Nocardia farcinica*  
*Nocardia otitidiscaviarum*  
*Pasteurella multocida* (動物に疾病をおこす血清型 ( Class 3 ) を除く)  
Pasteurella pneumotropica  
*Plesiomonas shigelloides*  
*Pseudomonas aeruginosa*  
Salmonella (Class 3 を除く全血清型) \*  
*Serratia marcescens*  
*Shigella* 全菌種  
*Staphylococcus aureus*  
*Streptobacillus moniliformis*  
*Streptococcus pneumoniae*  
*Streptococcus pyogenes*  
Streptococcus zooepidemicus \*  
*Treponema carateum*  
Treponema cuniculi  
*Treponema pallidum* subsp. *pallidum*  
*Treponema pallidum* subsp. *pertenue*  
*Vibrio cholerae*  
*Vibrio fluvialis*  
*Vibrio mimicus*  
*Vibrio parahaemolyticus*  
*Vibrio vulnificus*  
*Yersinia enterocolitica*  
*Yersinia pseudotuberculosis*

Class 3

*Bacillus anthracis*  
*Brucella* (全菌種)  
*Burkholderia mallei*  
*Burkholderia pseudomallei*  
*Chlamydia psittaci*  
*Coxiella burnetii*  
*Ehrlichia canis*  
*Ehrlichia sennetsu*  
*Francisella tularensis*  
*Mycobacterium africanum*  
*Mycobacterium bovis*  
*Mycobacterium tuberculosis*  
*Orientia tsutsugamushi*  
Pasteurella multocida (動物に疾病を起こす血清型 : B:6, E:6, A:5, A:8, A:9)  
*Rickettsia* spp.  
*Salmonella* serovar *paratyphi* A  
*Salmonella* serovar *typhi*  
*Yersinia pestis*

真菌

Class 1

Class 2 および Class 3 に属さない真菌  
(Class 2 あるいは Class 3 に近縁種がある場合は、それを参考にして判断する)

Class 2

*Acremonium kiliense*  
*Allescheria boydii*  
*Arachnia propionica*  
*Aspergillus fumigatus*  
*Aspergillus* spp. (毒素産生株)  
*Candida albicans*  
*Chaetomium* spp. (毒素産生株)  
*Cladosporium carrionii*  
*Cladosporium trichoides* (*C. bantianum*)  
*Cryptococcus neoformans*  
*Curvularia geniculata*  
*Dreschlera apiciferum*  
*Expophiala dermatitidis*  
*Fonsecaera pedrosoi*  
*Fusarium* spp. (毒素産生株)  
*Leptosphaeria senegalensis*  
*Madurella grisea*  
*Madurella mycetomii*  
*Microsporum canis*  
*Microsporum gypseum*  
*Mucor* sp.  
*Myrothecium* spp. (毒素産生株)  
*Neotestudina rosatii*  
*Penicillium* spp. (毒素産生株)  
*Phialophora jeanselmei*  
*Pneumocystis carinii* \* (従来、protozoa とされてきたが、真菌だとする場合もある)  
*Pyrenochaeta romeroi*  
*Rhizopus* sp.  
*Sporothrix schenckii*  
*Trychophyton mentagrophytes*  
*Trychophyton schoenleinii*  
*Trychophyton simii*  
*Trychophyton verrucosum*

Class 3

*Blastomyces dermatitidis*  
*Coccidioides immitis*  
*Cryptococcus neoformans*  
*Histoplasma capsulatum*  
*Histoplasma duboisii*  
*Histoplasma farciminosum*  
*Paracoccidioides brasiliensis*  
*Penicillium marneffeii*

寄生虫

Class 1

Class 2 および Class 3 に属さない原虫類、吸虫類、糸虫類および線虫類  
(Class 2 あるいは Class 3 に近縁種がある場合は、それを参考にして判断する)

Class 2

Protozoa

*Babesia* spp. (ookinete)



*Balantidium coli* (cyst)  
*Cryptosporidium* spp. (oocyst)  
*Eimeria* spp. (oocyst)  
*Encephalitozoon (Nosema) cuniculi* (spore)  
*Giardia* spp. (trophozoite, cyst)  
*Leishmania* spp. (promastigote, amastigote) ( レベル 3 に示すものを除く )  
*Neospora caninum* (cyst)  
*Pentatrichomonas hominis* (trophozoite)  
*Pneumocystis carinii* (cyst) \* (従来、protozoa とされてきたが、真菌だとする場合もある)  
*Sarcocystis* spp. (sporocyst, gametocyte)  
*Spironucleus muris*(trophozoite, cyst)  
*Trichomonas vaginalis* (trophozoite)

#### Trematoda

*Centrocestus* spp. (metacercaria)  
*Clonorchis sinensis* (metacercaria)  
*Dicrocoelium dendriticum* (metacercaria)  
*Echinostoma* spp. (metacercaria)  
*Echinochasmus perfoliatus* (metacercaria)  
*Fasciola hepatica* (metacercaria)  
*Fasciolopsis buski* (metacercaria)  
*Gigantobilharzia* spp. (cercaria)  
*Heterophyes heterophyes* (metacercaria)  
*Metagonimus yakogawai* (metacercaria)  
*Opisthorchis* spp. (metacercaria)  
*Paragonimus* spp. (metacercaria)  
*Plagiorchis muris* (metacercaria)  
*Trichobilharzia* spp. (cercaria)

#### Cestoda

*Bertiella studeri* (cysticercoid)  
*Diphyllobothrium latum* (plerocercoid)  
*Dipylidium* spp. (cysticercoid, proceroid, plerocercoid)  
*Diplogonoporus grandis* (plerocercoid)  
*Hymenolepis diminuta* (cysticercoid)  
*Raillietina celebensis* (cysticercoid)  
*Taenia* spp. (egg, cysticercus) ( レベル 3 に示すものを除く )  
*Vampirolepis (Hymenolepis) nana* (egg, cysticercoid)

#### Nematoda

*Ancylostoma* spp. (larva)  
*Anisakis* spp. (larva)  
*Ascaris lumbricoides* (egg)  
*Aspiculuris tetraptera* (egg)  
*Brugia* spp. (larva)  
*Capillaria hepatica* (egg)  
*Dirofilaria* spp. (larva)  
*Dracunculus medinensis* (larva)  
*Enterobius vermicularis* (egg)  
*Gnathostoma* spp. (larva)  
*Loa loa* (larva)  
*Mansonella perstans* (larva)  
*Necator americanus* (larva)  
*Onchocerca volvulus* (larva)  
*Pseudoterranova decipiens* (larva)  
*Rhabditis* spp. (larva)

*Syphacia* spp. (larva)  
*Thelazia callipaeda* (larva)  
*Toxocara* spp. (egg)  
*Trichostrongylus orientalis* (larva)  
*Trichuris trichiura* (egg)  
*Wuchereria bancrofti* (larva)

### Class 3

#### Protozoa

*Acanthamoeba (Hartmannella) culbertsoni* (trophozoite, cyst)  
*Entamoeba histolytica* (cyst)  
*Leishmania donovani* (promastigote, amastigote)  
*Leishmania braziliensis* (promastigote, amastigote)  
*Naegleria fowleri* (trophozoite, cyst)  
*Plasmodium falciparum* (erythrocytic stage, sporozoite)  
*Plasmodium malariae* (erythrocytic stage, sporozoite)  
*Plasmodium ovale* (erythrocytic stage, sporozoite)  
*Plasmodium vivax* (erythrocytic stage, sporozoite)  
*Simian malarial parasites* (erythrocytic stage, sporozoite)  
*Toxoplasma gondii* (tachyzoite, bradyzoite, oocyst)  
*Trypanosoma* spp. (trypomastigote, amastigote)

#### Trematoda

*Schistosoma* spp. (cercaria)

#### Cestoda

*Echinococcus* spp. (egg, hydatid sand)  
*Taenia solium* (egg)

#### Nematoda

*Angiostrongylus* spp. (larva)  
*Baylisascaris procyonis* (egg)  
*Capillaria philippinensis* (larva)  
*Strongyloides* spp. (larva)  
*Trichinella spiralis* (larva)